



# When Your Child Can't Breathe, Red Lights Seem Like an Eternity.

## Are Your Children Up-to-Date on their DTaP Vaccines?

Children need five DTaP immunizations to be fully protected against diphtheria, tetanus and pertussis. The 4th dose, given between 15 and 18 months, is the one most often missed.

- |  |  |
|--|--|
| Your baby should have a total of five DTaP immunizations, one at each of these ages: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 months</li> <li>• 4 months</li> <li>• 6 months</li> <li>• <b>15-18 months</b></li> <li>• 4-6 years</li> </ul> |
|--|--|

### Washington Rates Are High.

Pertussis (whooping cough) is on the rise in Washington. In 2003, there were 844 reported cases, many in young children.

### The Consequences Are Serious.

Often infants who get pertussis have to be hospitalized. It causes coughing that makes it hard for a child to eat, drink, or breathe. It can cause pneumonia, seizures, brain damage, and even death.

### All Children Are At-risk.

Pertussis is easily spread by coughing or sneezing. Children usually get pertussis from an adult or older child who is infected but who may seem to only have a mild cough.

### Protect Your Child.

Call your health care provider today to schedule your children's vaccination visit.

To find an immunization clinic near you, call Healthy Mothers, Healthy Babies at 800-322-2588.

For more information on DTaP and other childhood immunizations, visit [www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov).

### Please take one.

- Call Healthy Mothers, Healthy Babies at **800-322-2588** to find an immunization clinic near you.
- Visit [www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov) for more information on DTaP and other childhood immunizations.



**PUBLIC HEALTH**  
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND HEALTHIER WASHINGTON



This publication is available in other formats for people with disabilities. Call 1-800-525-0127 or TTY relay 711.



# Cuando su hijo no puede respirar, los semáforos duran como una eternidad.

## ¿Están al día las vacunas DTaP de sus hijos?

Los niños necesitan cinco vacunas DTaP para estar completamente protegidos contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. La cuarta dosis, que se administra entre los 15 y 18 meses, es la que suele faltar:

- |  |   |
|--|---|
| Su bebé debe tener un total de cinco vacunas de DTaP, administradas en cada una de estas edades: | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 meses</li><li>• 4 meses</li><li>• 6 meses</li><li>• <b>15 a 18 meses</b></li><li>• 4 a 6 años</li></ul> |
|--|---|

### La incidencia en Washington es elevada.

La tos ferina (pertusis) ha aumentado en Washington. En el 2003 se reportaron 844 casos, muchos de ellos en niños pequeños.

### Las consecuencias son graves.

Muchas veces es necesario hospitalizar al niño que tiene tos ferina. Esta enfermedad causa episodios de tos que le dificultan al niño comer, beber y hasta respirar. Puede causar pulmonía, convulsiones, daño cerebral y hasta la muerte.

### Todos los niños corren el riesgo.

La tos ferina se contagia fácilmente al toser o estornudar. Los niños usualmente se contagian con tos ferina por un adulto o niño mayor que está infectado pero que sólo parece tener una tos leve.

### Proteja a su hijo.

Llame al médico hoy mismo para hacer una cita para las vacunas de su hijo.

Para encontrar una clínica de vacunación cerca de su casa, llame a Healthy Mothers, Healthy Babies al 800-322-2588.

Para obtener más información sobre la vacuna de DTaP y otras vacunas infantiles, visite [www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov).

### Para usted.

- Llame a Healthy Mothers, Healthy Babies al 800-322-2588 para encontrar una clínica de vacunación cerca de su casa.
- Visite [www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov) para obtener más información sobre la vacuna de DTaP y otras vacunas infantiles.



**PUBLIC HEALTH**  
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND  
HEALTHIER WASHINGTON



Esta publicación se ofrece en otros formatos para las personas con discapacidades.

Llame al 1-800-525-0127 o releador TTY 711.